

★大腸内視鏡検査予約票★

マグコロール

1506

殿

ゆりのきクリニック

☆大腸カメラは、肛門よりカメラの付いた管を入れ、大腸にある病気を調べたり大腸にポリープのある方は、それを取り除いたりする検査および治療です。

検査予定日時は、

年 月 日 (曜日) 午後 時 分です。

この用紙を持参して10分前にお越し下さい。

検査時に鎮静剤を使用するため、検査後のお車の運転は危険ですので、お車でのご来院は絶対にお避け下さい。
(万が一乗られて来院した際には、事故を起こされても当院では責任を負いかねます。)

緑内障(眼科疾患)、心臓病(不整脈、狭心症など)、喘息、前立腺肥大等の既往のある方は、申し出て下さい。

抗血小板薬や抗凝固薬など服用されている方は必ずお申し出ください。服薬内容によっては検査当日の組織検査及びポリープ切除の施行状況が変わる場合があります。(お薬手帳は常に携帯してください。)

★大腸内視鏡検査は検査前日と当日は腸内を綺麗にする必要があります。

1) 検査前日 月 日 ()

・朝から**検査食**を食べてください(朝食、昼食、間食、夕食)

・下記の時間で下剤を飲んでください。

15時……ラキソベロン10ml、1本(コップ一杯の水に混ぜてお飲み下さい)

19時……マグコロールP、1包(スポーツドリンク又はお水300ccに溶かしてお飲み下さい。)

夕食は18時頃までにお済ませ下さい。夕食後以降から絶食です。低血糖予防のため、砂糖水・蜂蜜・飴玉などは朝から24時までには可能です。(糖尿病の方は過剰摂取はさけてください)

2) 検査当日 月 日 ()

・朝から**絶食**です。(血圧、心臓の薬は飲んでください)

また当日の水分は下剤以外は水だけは可能です。(糖分の含まれたものはとらないでください)

・() ……マグコロールP、2包(水2ℓに溶かしてお飲み下さい。)

最初の15分で500ml、以後15分ごとに250mlを目安としてお飲み下さい。(1時間45分かかります)

・当日7回以上の排便後、最終的にほぼ透明～薄い黄色となり 固形便がなくなれば検査準備完了です。

- ・来院したら検査着に着替えて、点滴をします。
- ・鎮静剤を使用します。(検査の苦痛を和らげるためです。)
- ・検査中は医師の指示に従ってください。
- ・検査終了後、ベッドで30分くらい休んでいただきます。
 - ・ガスが出ればお腹の張りも落ち着きます。
 - ・その後食事を開始してください。(食事は検査内容により説明があります。)



☆ポリープ切除については、下記の説明をご覧ください。

❖大腸ポリープ切除について❖

切除後は禁酒や食事制限が必要になります。

❖大腸内視鏡検査・治療の合併症❖

激しい腹痛や多量の出血がある場合はすぐにお知らせください。(夜間及び休診日は一時的に大学病院などでご相談ください。)

- ・**大腸穿孔(穴が開くこと)**……………発生頻度およそ 0.12%(場合によっては一時的に人工肛門になる可能性もあります。)
- ・**出血**……………発生頻度およそ 0.06%

☆ポリープ切除後当日は右記の食事のみ可能です。→おかゆ、素うどん、ゼリー、プリン、薄めのお茶・砂糖水・ポカリスエット。

☆**2週間は(当日を含む)は下記をお守りください。**

- ①禁酒及び暴飲暴食を控える
(ラーメン、餃子、カレー、にんにく料理、キムチ、明太子、揚げ物などは絶対に禁止。)
- ②食事量はいつもの7割くらいにとどめる。(満腹になるまで食べない!)
- ③生ものはやめる。(刺身)
- ④遠出の出張や旅行、運動はしないでください。

☆尚、組織検査またはポリープ切除をされた方は、別途保険点数が加算されます。

組織検査及びポリープ切除後の検査結果は約 10 日後に出ますので、その頃再度ご来院し、必ず結果を聞いてください。(特にこちらからの連絡はありませんので、ご注意ください。)

何か気になる症状がありましたら、早目に受診してください

☆ポリープ切除された方は、当日を含めた3日間、点滴来院が必要になります。(検査内容や休診日の関係で日程の変動がありますのでご了承ください。)



※大腸内視鏡検査・ポリープ切除術の同意書※ 使用下剤：マグコ

平成 年 月 日

説明医師氏名： 院長 上田哲郎 印

小出一樹 長島誠 森山彩子 鈴木隆 相馬明紀

(説明担当看護師：)

私は、前頁に記載された合併症も考慮したうえで、大腸内視鏡検査の施行及び組織検査の必要性やポリープが認められた場合には、組織検査や内視鏡下ポリープ切除術を行うこと(抗血小板薬や抗凝固薬の服薬内容によっては、施行状況が変わる場合もあること)に同意致します。

平成 年 月 日

住所： 氏名： 印

*この同意書は、検査当日に受付に提出してください。

*当日、来院出来ない事態が発生したときは、必ず当院に連絡して下さい。

ゆいのきクリニック 047-750-7555



検査時に鎮静剤を使用するため、検査後のお車の運転は危険ですので、お車でのご来院は絶対にお避け下さい。

(万が一乗られて来院した際には、事故を起こされても当院では責任を負いかねます。)

☆内視鏡下ポリープ切除術をされた患者さまへ



様 月 日 ()

本日、内視鏡下ポリープ切除術を行いました。術後の経過を悪化させないために、以下の注意事項を必ずお守りください。術後10日目でも下血や腹膜炎が発生することがあり、最悪の場合は一時的に人工肛門となりますので、厳重に注意をお守りください。

◇食事・・・★術後当日は下記の内容の食事制限をお願いします。

(おかゆ、素うどん ゼリー、プリン、砂糖水、ポカリスエット、薄めのお茶。)

★術後2週間は、下記を参考に食事制限をお守りください。

①禁酒

②暴飲暴食を控える(3日間はおかゆ、おじや、素うどん、半熟卵、豆腐を召し上がってください。)

③食事は、満腹まで食わず、7割くらいにとどめる。

④禁止食品

(にんにく、カレー、キムチ、明太子、ラーメン、餃子、揚げ物、七味、刺身、コーヒー、紅茶、濃いお茶など)

◇入浴・・・★術後当日はシャワーのみ。

腹痛や、出血などなければ、翌日から入浴は可能。(ただし特に1週間は長湯は避ける。)

◇運動・・・★術後1週間は激しい運動は避ける。

開始日は医師にご確認ください。

◇その他 ★腹圧をかけるような重たい荷物を持たない。

()

◇休薬があった場合・・・休薬したお薬は()から再開してください。

検査結果は約10日後の 月 日 () 頃に出ますので、その頃再度ご来院し、必ず結果を聞いてください。(こちらからの連絡はありませんので、ご注意ください)

点滴： 無 ・ 有 () 有の方は左記の日に来院してください。

激しい腹痛や出血、また具合が悪い時は早めに受診してください。尚、夜間や休診日などは、一時的に大学病院などで診察をしていただきますよう、お願い致します。

本日の切除術は、生命保険から補助が出る場合がありますので、加入されている保険会社に一度お問い合わせください。